

# GPS Feedbunk Management Evaluation

4



COMEDERO IDEAL

## Alimento disponible y distribuido en toda la longitud del comedero

Aporte continuo de una dieta fresca, de alta calidad, balanceada y no seleccionable sin competición de las vacas. Mejora:

- Consumo de materia seca & eficiencia alimentaria
- Salud ruminal
- Tiempo de descanso
- Producción de leche & componentes lácteos

3



## Alimento disponible y pero no distribuido uniformemente a lo largo del comedero

El alimento debe estar disponible a lo largo de todo el comedero, con el doble de cantidad de dieta distribuida cerca de los bebederos y de los cruces a ambos extremos del comedero y donde los bebederos están localizados. El arrimado del alimento se debe hacer en dos direcciones alternativamente para mantener alimento en los dos extremos, o usar una pala minicargadora para mover alimento de un extremo a otro.

2



## “Cemento” visible en algunos puntos y un borde de alimento a lo largo del comedero al alcance de las vacas

Arrimado de alimento frecuentemente para asegurar que todas las vacas tienen alimento a su alcance continuamente es esencial. Arrimar el alimento varias veces durante la mañana desde las 5 a las 10 am es muy importante porque todas las vacas quieren comer, e incluso debería ser arrimado con comida fresca distribuida en la mañana. El arrimado se llevó a cabo demasiado tarde en la foto.

1



## “Cemento” visible en algunos puntos y un borde de alimento a lo largo del comedero que no está al alcance de las vacas

El comedero debería estar cubierto uniformemente con comida fresca. Debido a que las vacas tienden a empujar el alimento hacia adelante, es esencial arrimar el alimento varias veces durante el día. El número recomendado de veces y la hora de arrimar el alimento está relacionado con muchos factores. La superpoblación de animales es un factor que requiere arrimar el alimento más frecuentemente.

0



COMEDERO VACIO

## Algo de alimento, pero este comedero debería ser considerado VACIO o cero

El objetivo es tener menos de 5% “cero eventos” en los comederos en una semana o mes, lo cual es definido como un comedero con menos de 100-150 lbs de dieta que permanecen en el comedero a la primera hora de alimentar el siguiente día. Nunca distribuir dieta fresca encima del alimento sobrante que debería ser retirado y registrado como sobrantes.

# GPS Feedbunk Management Evaluation

# 4

## Alimento disponible y distribuido en toda la longitud del comedero

Aporte continuo de una dieta fresca, de alta calidad, balanceada y no seleccionable sin competición de las vacas. Mejora:

- ✓ Consumo de materia seca & eficiencia alimentaria
- ✓ Salud ruminal
- ✓ Tiempo de descanso
- ✓ Producción de leche & componentes lácteos



**COMEDERO IDEAL**

# GPS Feedbunk Management Evaluation

# 3

## **Alimento disponible y pero no distribuido uniformemente a lo largo del comedero**

El alimento debe estar disponible a lo largo de todo el comedero, con el doble de cantidad de dieta distribuida cerca de los bebederos y de los cruces a ambos extremos del comedero y donde los bebederos están localizados. El arrimado del alimento se debe hacer en dos direcciones alternativamente para mantener alimento en los dos extremos, o usar una pala minicargadora para mover alimento de un extremo a otro.



# GPS Feedbunk Management Evaluation

# 2

**“Cemento” visible en algunos puntos y un borde de alimento a lo largo del comedero al alcance de las vacas**

Arrimado de alimento frecuentemente para asegurar que todas las vacas tienen alimento a su alcance continuamente es esencial. Arrimar el alimento varias veces durante la mañana desde las 5 a las 10 am es muy importante porque todas las vacas quieren comer, e incluso debería ser arrimado con comida fresca distribuida en la mañana. El arrimado se llevó a cabo demasiado tarde en la foto.



# GPS Feedbunk Management Evaluation

# 1

**“Cemento” visible en algunos puntos y un borde de alimento a lo largo del comedero que no está al alcance de las vacas**

El comedero debería estar cubierto uniformemente con comida fresca. Debido a que las vacas tienden a empujar el alimento hacia adelante, es esencial arrimar el alimento varias veces durante el día. El número recomendado de veces y la hora de arrimar el alimento está relacionado con muchos factores. La superpoblación de animales es un factor que requiere arrimar el alimento más frecuentemente.



# GPS Feedbunk Management Evaluation

**O**

**Algo de alimento, pero este comedero debería ser considerado VACIO o cero**

El objetivo es tener menos de 5% “cero eventos” en los comederos en una semana o mes, lo cual es definido como un comedero con menos de 100-150 lbs de dieta que permanecen en el comedero a la primera hora de alimentar el siguiente día. Nunca distribuir dieta fresca encima del alimento sobrante que debería ser retirado y registrado como sobrantes.



**COMEDERO VACIO**